

# Utilisation du pansement Suprasorb® X+PHMB dans la prise en charge d'ulcérations de jambe chez une personne âgée

**L Prevost**

Infirmière référente - EHPAD Maurice Fécan – Amiens (80)

## Introduction :

Patiente âgée de 96 ans, présentant des ulcérations mixtes sur la face antérieure de la jambe gauche, évoluant depuis plus de 6 ans. Les prélèvements cutanés ont mis en évidence la présence de staphylocoque doré méti-R (BMR).

La plaie est très douloureuse lors de la réfection des pansements et saigne abondamment, la patiente est anxieuse à la vue de son état cutané. Elle est suivie régulièrement en consultation de Dermatologie à l'hôpital, sans amélioration notable.

## Matériels et méthodes :

Au mois de février 2009, elle est hospitalisée pour anémie avec une hémoglobine à 7,7g/l, elle bénéficie d'une transfusion sanguine.

Dès son retour, nous décidons d'utiliser le pansement HydroBalance Suprasorb® X+PHMB que nous recouvrons de tulle gras Lomatuell® H puis d'une bande de compression. La réfection est effectuée tous les 2 jours.

Après quelques semaines, nous observons une amélioration significative des ulcérations avec absence de douleur et disparition des saignements. Nous poursuivons donc ce protocole.

Au mois de septembre, les ulcérations ont pratiquement disparu, seule persiste une petite zone superficielle au bas de la jambe. L'hémoglobine est remontée à 10,8g/l.



**Mars 2009 :**  
plaie fortement hémorragique saturant le pansement américain



**Mars 2009 :**  
Ulcérations de la jambe avant utilisation de Suprasorb® X+PHMB



**Septembre 2009 :**  
Seules subsistent 2 petites zones ulcérées



**Décembre 2009 :**  
Cicatrisation complète

## Conclusion :

**Suprasorb® X+PHMB a apporté :**

- Une guérison des ulcérations.
- Une amélioration de l'état général avec stabilisation du taux d'hémoglobine et remontée du taux d'albumine.
- Une meilleure qualité de vie par l'absence de douleur.